



27^ο

Πανελλήνιο Συνέδριο

Νεφρολογίας

Αλεξανδρούπολη

20-23 Μαΐου 2026 Ξενοδοχείο Astir-Egnatia



Η επιβίωση των ασθενών υπό περιτοναϊκή κάθαρση σε σχέση με την επίπτωση της περιτονίτιδας κατά την τελευταία 20ετία.

Η εμπειρία ενός κέντρου

Τ. Μπούντα, Β. Λαμπροπούλου, Π. Κρίκη, Χ. Πάττας, Ε. Μουρβάτη, Κ. Κανταρτζή, Σ. Παναγούτσος

Πανεπιστημιακή Νεφρολογική Κλινική ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εισαγωγή - Σκοπός



- Τα τελευταία έτη καταγράφεται, υπάρχει βελτίωση στην επιβίωση των ασθενών, οι οποίοι εντάσσονται σε Περιτοναϊκή Κάθαρση (ΠΚ), σε σχέση με παλαιότερα έτη. Το γεγονός αυτό το αποδίδουν αρκετοί συγγραφείς στην ανάπτυξη της μεθόδου της Αυτοματοποιημένης ΠΚ (ΑΠΚ) είτε στη χρήση νεότερων περιτοναϊκών διαλυμάτων είτε στη **μείωση της επίπτωσης της περιτονίτιδας**.
- Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αναζήτηση της συχνότητας της περιτονίτιδας στο κέντρο μας τις τελευταίες δύο δεκαετίες (2005-2015 και 2015-2025) και η επίπτωσή της στην επιβίωση των ασθενών.

Ασθενείς - Μέθοδοι



- Καταγράφηκε η επίπτωση της περιτονίτιδας σε 233 ασθενείς υπό ΠΚ
 - Συγκρίθηκε ο αριθμός και ο ρυθμός περιτονίτιδας (κατά ISPD) κατά τις δύο δεκαετίες (2005-2015 και 2015-2025)

$$\text{Peritonitis rate} = \frac{\text{Αριθμός επεισοδίων περιτονίτιδας}}{\text{Συνολικά patient-years σε ΠΚ}}$$

- Χωρίσθηκαν οι ασθενείς σε δύο ομάδες ανάλογα αν εμφάνισαν (Ομάδα Α) ή αν δεν εμφάνισαν (Ομάδα Β) περιτονίτιδα
 - συγκρίθηκε η επιβίωσή τους με μέθοδο Kaplan-Meier και αναζητήθηκαν οι παράγοντες κινδύνου θνητότητας με μέθοδο Cox Regression.

Αποτελέσματα




	Δεκαετία 2005-2015	Δεκαετία 2015-2025	p
Αριθμός (N)	129	104	
Ηλικία (Έτη*)	75 (65, 81)	72 (58, 78)	0,014
Διάρκεια ΠΚ (Μήνες*)	37 (21, 68)	30 (16, 30)	0,041
Φύλο (Α/Γ)	74/55	72/32	0,042
Περιτονίτιδα (Όχι/Ναι)	80/49	88/16	<0,001
Περιτονίτιδες (Αριθμός*)	0 (0, 2)	0 (0, 0)	<0,001
Ρυθμός περιτονίτιδας	0 (0, 0,03)	0 (0, 0)	<0,001
Μέθοδος (CAPD/APD)	66/63	36/68	0,008

*Median (IQR 25,75)

Αποτελέσματα



10ετής Σταθμισμένη Επιβίωση των ασθενών τις δύο δεκαετίες



Αποτελέσματα




	A (Με περιτονίτιδα)	B (Χωρίς περιτονίτιδα)	p
Αριθμός (N)	65	168	
Ηλικία (Έτη*)	74 (63, 81)	73 (60, 80)	0.203
Διάρκεια ΠΚ (Μήνες*)	43 (29, 83)	30 (16, 52)	<0,001
Φύλο (Α/Γ)	36/29	110/58	0,138
Δεκαετία (1 ^η /2 ^η)	49/16	80/88	<0,001
Μέθοδος (CAPD/APD)	66/63	36/68	0,185

*Median (IQR 25,75)

Αποτελέσματα



10ετής Σταθμισμένη Επιβίωση των ασθενών με ή όχι περιτονίτιδα



Αποτελέσματα



Variables in the Equation

	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)
ΔΕΚΑΕΤΙΑ (2/1)	-.259	.169	2.341	1	.126	.772
ΦΥΛΟ (Γ vs Α)	.047	.164	.083	1	.773	1.049
ΗΛΙΚΙΑ	.019	.006	10.732	1	.001	1.019
ΑΡΙΘ ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΩΝ	-.177	.105	2.833	1	.092	.838
ΠΕΡΙΤΟΝΙΤΙΔΑ (ΝΑΙ vs ΟΧΙ)	-.377	.299	1.582	1	.209	.686
PERITONITIS RATE	3.729	.776	23.103	1	<.001	41.647
ΜΕΘΟΔΟΣ (APD vs CAPD)	-.664	.161	16.998	1	<.001	.515



Συμπέρασμα

- Η επίπτωση της περιτονίτιδας, παρά τη μείωσή της την τελευταία δεκαετία στο κέντρο μας, εξακολουθεί να επηρεάζει την επιβίωση των ασθενών, εκείνων οι οποίοι έχουν αυξημένο ρυθμό περιτονίτιδας (peritonitis rate).