

27^ο Πανελλήνιο
Συνέδριο
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΕΦΡΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ
ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ
ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

N. Μάρκου¹, Χ. Καϊταντζόγλου¹, Σ. Φωκάς², Ι. Γιατράς¹, Χ. Γακιοπούλου³, Α. Γεράκης¹

¹ Νεφρολογικό Τμήμα ΔΘΚΑ Υγεία


² Νεφρολογική κλινική ΝΕΜΕΣΟΣ

³ Παθολογοανατομικό Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή

Νεφροτοξικότητα από ανοσοθεραπεία : πρόκληση

- Πορεία νεφρικής λειτουργίας;
- Αλλαγή ογκολογικού σχήματος ή επαναχορήγηση;
- Υποτροπή μετά από επαναχορήγηση;



ΣΚΟΠΟΣ



- Να μελετηθεί η έκβαση της νεφρικής λειτουργίας των ασθενών με οξεία νεφρική βλάβη, ιστολογικά επιβεβαιωμένη υπό ανοσοθεραπεία



- Να διερευνηθούν οι προγνωστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας



- Να εξεταστεί η ασφάλεια και τα αποτελέσματα μετά την επαναχορήγηση της ανοσοθεραπείας

Υλικό και μέγεθος



- Προοπτική μελέτη ενός κέντρου (2016-2025)
- **23 ασθενείς** (10 άνδρες, 13 γυναίκες) με ιστολογικά τεκμηριωμένη οξεία νεφρική βλάβη υπό ανοσοθεραπεία
- Μέση ηλικία: $70,1 \pm 8,9$ έτη



- Διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 10(4-36) μήνες




- **Μερική/Πλήρης αποκατάσταση** της νεφρικής λειτουργίας



- Καταγραφή **υποτροπής μετά από επαναχορήγηση** ανοσοθεραπείας (n=12)


Υλικό και μέθοδος

Ιστολογικός τύπος




Αποτελέσματα


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



Πλήρης αποκατάσταση νεφρικής λειτουργίας ανά ιστολογικό πρότυπο (N=23)



Συσχέτιση αποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας με το χρόνο λήψης ανοσοθεραπείας




• Η πλήρης αποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας **δεν** συσχετίστηκε με

1. είδος της κακοήθειας
2. είδος της ανοσοθεραπείας
3. συγχορήγηση χημειοθεραπείας
4. συγχορήγηση PPIs
5. στάδιο της οξείας νεφρικής βλάβης
6. βαθμός λευκωματουρίας

Επαναχορήγηση ανοσοθεραπείας

- ❑ Όλοι όσοι είχαν ογκολογική ένδειξη (n=12)
- ❑ Διάμεσος χρόνος παρακολούθησης 12,5 μήνες (6-24) μετά την επαναχορήγηση
- ❑ Νεφρική υποτροπή σε **2 ασθενείς**:
 - Ένας με μεμβρανώδη ΣΝ, full house IF (υποτροπή νεφρωσικού συνδρόμου)
 - Ένας με ΟΔΝ, ο οποίος συνέχισε την ανοσοθεραπεία με ταυτόχρονη μικρή δόση κορτικοειδών, διατηρώντας σταθερή νεφρική λειτουργία

ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
N = 12 ασθενείς



Συμπεράσματα



- ✓ Η **νεφρική έκβαση** των ασθενών με ONB και καρκίνο υπό ανοσοθεραπεία ήταν **ευνοϊκή**.
- ✓ Καλύτερη πρόγνωση σε περιπτώσεις **διάμεσης νεφρίτιδας**.
- ✓ Μικρότερος **χρόνος έκθεσης** στην ανοσοθεραπεία συνδέεται με καλύτερη έκβαση.
- ✓ Η **επαναχορήγηση** ήταν **εφικτή και ασφαλής** στην πλειονότητα των ασθενών.

Σας ευχαριστώ πολύ